

14. SEP. 2011 16:11 228151785

Skr. Patologii Noworodka

#7079 P.001 / 003



CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

P. Kujawa
 Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
 Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
 T: 022 815 70 00; F: 022 815 15 10
 www.czd.pl

Departament Matki i Dziecka	
2011 -09- 15	
Znak sprawy.....	3281
Przekazano.....	

Dagmara Korbasińska
 Dyrektor Departamentu
 Matki i Dziecka
 ul. Miodowa,
 Ministerstwo Zdrowia

Dotyczy :MZ-MD-62-1689-33/JK/11

Stanowisko Pani Dyrektora

Stanowisko Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw pneumokokom u dzieci z grup ryzyka

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2011r, dotyczące pozytywnej opinii CHMP dopuszczające stosowania szczepionki Synflorix w grupie wiekowej 2-5 r.ż. podajemy szczegółowe informacje związane z realizacją uodpornienia z użyciem PCV10.

W Charakterystyce Produktu Leczniczego Synflorix zarejestrowany sposób dawkowania w tej grupie wiekowej obejmuje dwie dawki w odstępie co najmniej 2 miesięcy .

W odniesieniu do grup ryzyka, opublikowano dotychczas rekomendacje ekspertów dotyczące preparatów Prevenar i Prevenar 13. Wynika z nich, że w wieku od 2 do 5 lat, dla dzieci przewlekle chorych bez niedoborów odporności, w szczepieniu pierwotnym zalecana jest 1 dawka (Tabela). Trudno w tej chwili określić, czy i kiedy powstaną rekomendacje dla szczepionki PCV10 dla dzieci z grup ryzyka i jaki będzie schemat szczepień, jednak z pewnością będą wymagane co najmniej dwie dawki, jak dla dzieci zdrowych. Aktualnie nie wiadomo, czy będą wymagane kolejne dawki przypominające.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące schematu szczepień u wcześniaków, należy rozważyć czy szczepienie w tej grupie to szczepienie populacyjne czy ograniczone do grup ryzyka. Z krajowych danych epidemiologicznych wynika, że grupy ryzyka IChP wg rozporządzenia z 18 sierpnia 2011 stanowią około 10% całej kohorty urodzeniowej, rozsianych na terenie całego kraju. Oznacza to, że nie można przyjąć iż są to szczepienia populacyjne, a zatem rekomendowany dla nich schemat szczepień, zarówno dla PCV10 jak i PCV13, niezależnie od masy ciała niemowlęcia powinien obejmować następującą liczbę dawek:

- dla dzieci szczepionych między 2 a 6 miesiącem życia - 3+1
 - dla dzieci szczepionych między 7 a 11 miesiącem życia - 2+1
 - dla dzieci szczepionych między 12 a 23 miesiącem życia - 1+1
 - dla dzieci szczepionych między 24 a 60 miesiącem życia
- dla PREVENAR 13 - 1 dawka
 dla SYNFLORIX - 1+1



